



Plan Nacional Resistencia Antibióticos

Recomendaciones sobre prescripción antimicrobiana en Atención Primaria (Adultos)

Línea estratégica II: Control



Sanidad
animal



Salud
humana



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD



agencia española de
medicamentos y
productos sanitarios

**Agencia Española de Medicamentos
y Productos Sanitarios (AEMPS)**

Calle Campezo, 1, Edificio 8 • E-28022 Madrid
<https://www.aemps.gob.es>

Fecha de publicación: junio de 2017

Maquetación: Imprenta Nacional de la AEBOE.
Avda. de Manoteras, 54. 28050 Madrid

Recomendaciones sobre prescripción antimicrobiana en Atención Primaria (Adultos)



Recomendaciones sobre prescripción antimicrobiana en Atención Primaria (Adultos)

- 1) No prescribir antibióticos en la faringoamigdalitis, salvo que exista una alta sospecha de etiología estreptocócica y/o que el resultado de la prueba rápida de detección de antígeno de *S. pyogenes* (Strep A o similar) sea positiva.
- 2) No tratar con un antibiótico diferente al de primera elección, penicilina V, las faringoamigdalitis estreptocócicas no recurrentes si el paciente no es alérgico a la penicilina.
- 3) No prescribir antibióticos en la sinusitis aguda, salvo que persista rinorrea purulenta y dolor maxilofacial o dental durante más de 7 días, o cuando los síntomas hayan empeorado después de una mejoría clínica inicial.
- 4) No prescribir antibióticos orales para la otitis externa aguda no complicada.
- 5) No tratar con antibióticos las conjuntivitis que se presuman de origen viral.
- 6) No prescribir antibióticos en infecciones del tracto respiratorio inferior en adultos inmunocompetentes y sin comorbilidades en los que clínicamente no se sospecha neumonía.
- 7) No prescribir antibióticos en las bacteriurias asintomáticas de los siguientes grupos de población: mujeres premenopáusicas no embarazadas, pacientes diabéticos, ancianos, ancianos institucionalizados, pacientes con lesión medular espinal y pacientes con catéteres urinarios.
- 8) No realizar profilaxis de forma rutinaria en pacientes con sonda vesical crónica al cambiar la sonda. Considerarla en pacientes con antecedentes de traumatismos durante el procedimiento o de infección sintomática tras el cambio, y en pacientes de riesgo como inmunodeprimidos o enfermedad grave de base.
- 9) No prescribir fármacos antifúngicos por vía oral ante sospecha de onicomicosis sin confirmación de la infección.
- 10) No mantener un tratamiento antibiótico que esté tomando un paciente si se sospecha una infección no bacteriana.
- 11) No utilizar la fosfomicina trometamol con posología diferente a la aprobada para infecciones agudas no complicadas de las vías urinarias bajas (1 sobre de 3 gramos en una sola dosis).
- 12) No utilizar la amoxicilina con ácido clavulánico si el probable microorganismo causante de la infección no produce betalactamasas (Ej.: *S. pyogenes*; *S. pneumoniae*).
- 13) No utilizar amoxicilina y ácido clavulánico 1000/62,5mg comprimidos de liberación prolongada fuera de la indicación aprobada (algunas neumonías adquiridas en la comunidad).

Bibliografía

- Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC). Recomendaciones no hacer. Barcelona: 2014. Disponible en:
<https://www.semfy.com/wp-content/uploads/2016/05/Doc33Recomendaciones-NoHacer.pdf>
[Accedido: 11/10/2017]
- Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad. Doce Sociedades Científicas presentan recomendaciones a los profesionales para no realizar intervenciones innecesarias. Madrid: 2013. Disponible en:
<http://www.msssi.gob.es/gabinete/notas-Prensa.do?id=3140>
[Accedido: 11/10/2017]
- Choosing Wisely®: an initiative of ABIN Foundation [Internet]. Filadelfia: 2017. Disponible en:
<http://www.choosingwisely.org/>
[Accedido: 11/10/2017]
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Do not to do recommendations. Londres: 2017. Disponible en:
[https://www.nice.org.uk/Search?om=\[{«ndt»: \[«Do not do recommendations»\]}\]&ps=50&sp=on](https://www.nice.org.uk/Search?om=[{«ndt»: [«Do not do recommendations»]}]&ps=50&sp=on)
[Accedido: 11/10/2017]
- Fernández Urrusuno R, Serrano Martino C, Corral Baena S *et al.* Guía de Terapéutica Antimicrobiana del Área Aljarafe. 2.ª edición. Sevilla: Distrito Sanitario Aljarafe y Hospital San Juan de Dios del Aljarafe; 2012.

Coordinadores:

Mario Bárcena (SEMG)
Carmen Aspiroz (Grupo de Estudio de la Infección en Atención Primaria de la SEIMC, GEIAP-SEIMC)

Miembros del grupo de revisión:

Carmen Aspiroz (GEIAP-SEIMC)
Mario Bárcena (SEMG)
José Luis Cañada (SEMERGEN)
Josep M.ª Cots (semFYC)



Plan Nacional
**Resistencia
Antibióticos**



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES
E IGUALDAD



agencia española de
**medicamentos y
productos sanitarios**